

Öppna jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2013

Område: Strokesjukvård

Indikator: 103 Stroke Test av sväljförmåga

Kontaktperson: Johan Sanner Johan.Sanner@liv.se

En indikator som också har högsta prioritet 1 enligt Nationella riktlinjerna. Att man testar detta gör att man minskar risken för aspiration och lunginflammation. Man har också angivit målnivåer, hög 95 procent, måttlig 80 procent.

Hur ligger vårt landsting till och varför:

Riksgenomsnitt:	94 procent
CSK	81 procent
Arvika	98 procent
Torsby	96 procent

Indikatorn mäter andelen patienter som genomgått test av sväljförmågan vid ankomst till sjukhuset, eller patienter där sväljförmågan inte kunnat testas på grund av patientens tillstånd.

Här är det framför allt på CSK man ligger rejält under riksgenomsnittet. En av orsakerna är att man inte dokumenterar alla sväljtester. En annan viktig förklaring är att patienter som inte vårdas på strokeenhet i stor utsträckning inte genomgår sväljtestning.

Vilka förbättringsåtgärder pågår:

Internt finns behov av utbildningsinsatser, både gällande vikten av att utföra sväljtest och att dokumentera den samma i journal.

I arbetet i strokeprocessen kommer indikatorerna ha en central roll och ”problemindikatorerna” lyftas fram.

Se även indikator 101 ”Vård vid strokeenhet”.