

Öppna jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2013

Område: Neurologisk sjukvård

Indikator: 111. Bromsmedicin vid sekundärprogressiv MS

Kontaktperson: Rune Johansson Rune.Johansson@liv.se

Hur ligger vårt landsting till och varför:

Vid behandling av sekundär progressiv Multipel skleros ligger landstingets siffror lägre än rikets (2,8 procent jämfört med 7,4 procent). Behandlingsfrekvensen ska här ligga lågt men orsak kan vara att urvalet för statistiken valts på ett sätt där funktionsnivån är utgångspunkt för vad sekundär progressiv sjukdom är. I den grupp man tittar på bör behandlingsfrekvensen ligga mycket lågt medan behandling vid sekundär progressiv Multipel skleros utan så påtagligt handikapp bör ligga något högre. Data som är validerade rörande vad rimlig behandlingsfrekvens ska ligga på saknas i dagsläget för denna grupp.

Vilka förbättringsåtgärder pågår:

I den mån registreringar saknas och detta är orsak till viss avvikelse ses detta över genom fortsatt uppdatering av registret Multipel skleros.

Behandlingsfrekvensen för denna grupp av MS-patienter ska inte öka med mindre än att det kommer nya vetenskapliga data som visar på god effekt av bromsmedicinering.