

Öppna jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2013

Område: Psykiatrisk vård

Indikator: 140. Depressionsskattning vid ECT-behandling

Kontaktperson: Britt Lindberg Britt.Lindberg@liv.se

Hur ligger vårt landsting till och varför:

Att undersöka och dokumentera kvarvarande symtom på depression efter ECT är viktigt, då kvarvarande symtom är en riskfaktor för snabbt recidiv. Indikatorn visar andelen behandlingsserier där sådan skattning med MADRS/MADRS-S skett inom en vecka efter ECT.

Måttet visar andelen behandlingsserier med ECT vid depression där patienterna skattat sina depressionssymtom med symtomskattningsskalorna MADRS/MADRS-S. Resultatet för kvinnor i Värmland ligger på 0 procent jämfört med rikets 39,5 procent. Motsvarande för män ligger på 5,9 procent i Värmland mot rikets 37,5 procent vilket är 84,3 procent sämre. Totalt ligger Värmland på 2,2 procent vilket är 94,3 procent sämre än rikets 38,8 procent. Datakälla är Kvalitetsregister ECT och felkällor kan vara varierande täckningsgrad och att andra skattningsskalor än MADRS/MADRS-S kan ha använts.

Vilka förbättringsåtgärder pågår:

Dessa siffror skall bli spännande att följa ju mer vi registrerar i kvalitetsregistret. Ett stort arbete har skett med ökad registrering i kvalitetsregister i år, men målet är att ytterligare förbättra registreringen och därmed bättre kunna följa ovanstående indikator.