

Öppna jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2014

Område: Stroke

Indikator: 225. Andel patienter med blodförtunnande behandling vid stroke 12-18 månader efter stroke och vid förmaksflimmer, 2011-2012 (ålder 55-79år)

Kontaktperson: Johan Sanner Johan.Sanner@liv.se

Hur ligger vårt landsting till och varför:

Riksgenomsnitt: 76.9 procent (71.5 procent 2010-2011)

Värmland: 75.2 procent (65.3 procent 2010-2011)

Landstinget i Värmland ligger på en nivå nära riksgenomsnittet och en betydligt högre andel jämfört föregående mätning. De senaste åren har problemet med underbehandling med blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer poängterats alltmer. Dessutom har det kommit nya blodförtunnande läkemedel på marknaden och användningen av dessa ökar i Sverige.

Vilka förbättringsåtgärder pågår:

Här kan vi bli ännu bättre genom att sprida informationen om vikten av blodförtunnande läkemedel. Primärvården har också en viktig roll när det gäller denna indikator.

Information via listan över Rekommenderade läkemedel. Bättre uppföljning av riksstrokedata. Bör ingå som viktig kvalitetsindikator i strokeprocessen.

En gemensam Strokemanual för landstinget har utarbetats där behandling med blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer och genomgången TIA eller stroke avhandlas. Genom delprojektet med Tum-EKG räknar vi med att finna fler patienter med förmaksflimmer som drabbats av stroke och behandla en större andel med effektiva blodförtunnande läkemedel.