

Dokumenttyp Vårdrutin	Ansvarig verksamhet Hälso- och sjukvårdens ledningsstöd	Version 4	Antal sidor 2
Dokumentägare Eric Le Brasseur Medicinskt ledningsansvarig Regional vaccinationsenhet covid-19	Fastställare Lena Gjevort Hälso- och sjukvårdsdirektör	Giltig fr.o.m. 2021-08-18	Giltig t.o.m. 2023-08-18

Handläggning vid misstanke om biverkningar efter vaccination mot covid-19

Gäller för: Hälso- och sjukvård

Det är vanligt med övergående biverkningar efter vaccination mot covid-19 såsom trötthet och feber samt ömhet vid injektionsstället eftersom immunförsvaret reagerar på vaccinationen. I mycket sällsynta fall kan det uppstå allvarliga biverkningar och alla personer som vaccineras förses därför med skriftlig information om vikten att söka vård vid allvarliga symtom. Det är viktigt med adekvat utredning och biverkningsrapportering vid misstanke om biverkning efter vaccination mot covid-19.

Myokardit och perikardit

Mycket sällsynta fall av myokardit och perikardit har rapporterats efter vaccination med mRNA-vaccin mot covid-19. De flesta fall var lindriga och gick tillbaka inom några dagar. Fallen inträffade mestadels inom 14 dagar efter vaccinationen, oftare efter den andra dosen och hos yngre män.

Symtom på myokardit och perikardit kan variera men innebär ofta andfåddhet, kraftfulla hjärtslag som kan vara oregelbundna och bröstsmärtor. Tillstånden försvinner vanligtvis av sig självt eller efter behandling.

Att vara uppmärksam på

Personer som vaccineras mot covid-19 i Region Värmland erhåller skriftlig information om att söka vård om allvarliga symtom uppstår efter vaccination.

Till allvarliga symtom räknas till exempel:

- Bröstsmärta
- Påverkan på andningen
- Hjärtklappning

Handläggning

Sedvanlig utredning med kliniskt status inklusive EKG och remiss till närmaste internmedicinsk klinik för bedömning.

Vårdpersonal bör rapportera alla fall av myokardit eller perikardit hos personer som nyligen har vaccinerats med covid-19 vaccin till Läkemedelsverket.

De som insjuknat med myokardit eller perikardit efter vaccination mot covid-19 bör inte vaccineras med dos 2.

Trombos och trombocytopeni

En kombination av trombos och trombocytopeni, i vissa fall tillsammans med blödning, har observerats i mycket sällsynta fall efter vaccination med Vaxzevria. Detta inkluderar allvarliga fall av ventrombos, inklusive ovanliga områden såsom cerebral venös sinustrombos, mesenterisk ventrombos, men även artärtrombos, samtidigt med trombocytopeni. Majoriteten av dessa fall uppkom inom de första 7 till 14 dagarna efter vaccination.

Att vara uppmärksam på

- Tecken på trombocytopeni såsom petechier, ekkymoser, slemhinneblödningar
- Feber, allvarliga allmänsymtom, oklar inflammation
- Svår huvudvärk som uppstår några dagar efter vaccination
- Nyttillkomna neurologiska bortfall
- Cerebral sinusventrombos
- Tromboser i bukkärl, till exempel portavenstrombos
- DVT/lungemboli
- Viktigt är att även testa för covid-19, då ovannämnda tillstånd också kan vara symtom på covid-19

Handläggning på vårdcentral

Blåmärken eller okomplicerad mindre blödning

- Kontroll blodprover: blodstatus och B-celler, PK, APT-tid
- Frikostig uppföljning med ny kontakt med vårdcentralen
- Biverkningsrapportering till Läkemiddelsverket utifrån situation och rimlighet
- Kontakt med medicinbakjour vid behov, till exempel vid trombocytopeni

Svåra besvär såsom till exempel venös tromboembolism, blödning eventuellt i kombination med trombocytopeni

- Remiss till närmaste internmedicinsk klinik för bedömning

Handläggning på internmedicinsk klinik

- Sedvanlig utredning av medicinska tillstånd inklusive kontroll av laboratorieprover: blodstatus, B-celler, PK, APT-tid, elektrolytstatus, leverstatus, LD
- Kontakt med hematolog och eventuellt koagulationsspecialist för rådgivning och utvidgad provtagning vid tecken på venös tromboembolism i kombination med trombocytopeni och/eller blödning
- Viktigt med noggrann biverkningsrapportering till LMV om tidsband (mindre än 14 dagar) med vaccinering mot covid-19 och biverkan ej kan uteslutas

Koagulationsjourer

- Malmö/Lund: 040-331000
- Stockholm: 08-51772626 alternativt 08-51770000
- Göteborg: 031-3421000

Relaterad information

- Refererat dokument: RUT-09732 Rapportering och klassificering av läkemedelsbiverkningar
- [Läkemiddelsverkets samlade information om vaccination mot covid-19](#)
- [Folkhälsomyndighetens vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19](#)
- [Råd från Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas](#)

Dokumentet är utarbetat av: Eric Le Basseur Anders Gustavsson, Ingmar Nilsson, Anna Wimmerstedt